

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ TIỂU PHẪU RĂNG SỐ 8 BIẾN CHỨNG

	Khám	Cận lâm sàng	Nguyên tắc điều trị	Thuốc	Chăm sóc
Ngày 1	- Khám và chẩn đoán: + Răng khôn mọc lệch, không đủ chỗ mọc gây đau. + Răng khôn mọc lệch gây nhồi nhét thức ăn gây viêm nướu, làm sâu răng bên cạnh. +Răng không ngậm, không đủ chỗ mọc gây sưng vùng góc hàm, gây cứng khít hàm, gây đau nhức.	- X-quang chéo nghiêng răng gây biến chứng. Hoặc Paranaoma. Hoặc CT Scanner - Xét nghiệm TBTTB máu ,APTT	- Nội khoa giảm triệu chứng.	- Kháng sinh: Augmentin, Zinnat, Rodogyl, (Spiramycine+ Metronidazole) - Corticoid - Giảm đau	- Vệ sinh răng miệng.
Ngày 2	- Khi triệu chứng giảm có thể nhổ răng.	Nếu có <u>hình</u> ảnh chân răng nằm trong kênh răng dưới cho chụp CT	- Tiểu phẫu nhổ răng khôn.	- Kháng sinh - Corticoid - Giảm đau	- Ăn thức ăn mềm, nguội, lạnh, không súc nước muối. - Chườm lạnh ngoài mặt vùng răng nhỏ, ngậm đá
Ngày 3	- Theo dõi đánh giá vùng răng đã nhổ: tình trạng sưng, đau, chảy máu, nhiễm trùng sau nhổ. - Nếu tình trạng bệnh ổn có thể cho xuất viện.		- Phòng ngừa nhiễm trùng sau nhổ răng.	- Kháng sinh - Corticoid - Giảm đau	- Giữ vệ sinh răng miệng, hẹn tái khám sau 1 tuần.