

**PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ**  
**PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ MỘNG THỊT**

**1. Chẩn đoán và điều trị**

Ngày	Khám	Cận lâm sàng	Nguyên tắc điều trị	Thuốc	Chăm sóc
1	<b>TCCN:</b> - Kích thích mắt: nóng rát, sợ ánh sáng, cảm giác dị vật, chảy nước mắt. - Đau khi có loét giác mạc nhỏ quanh đầu mộng. <b>TCTT</b> - Mờ đục giác mạc phía chu biên <input type="checkbox"/> Thay đổi phim nước mắt - Lạn thị - Hạn chế vận nhãn 1 phần	<b>Xét nghiệm tiền phẫu</b> - TPTTB máu bằng laser, APTT, PT, urê, creatinin, đường huyết, SGOT, SGPT, tổng phân tích nước tiểu 10 thông số	- Cắt mộng đơn thuần - Cắt mộng Mitomycin C - Cắt mộng + ghép kết mạc tự thân	-Thuốc uống: +Kháng sinh +Kháng viêm +Giảm đau - Thuốc nhỏ: +Kháng sinh +Kháng viêm +Nước mắt nhân tạo bảo vệ bề mặt giác mạc	- Rửa mắt - Hướng dẫn bệnh nhân giữ vệ sinh mắt
2	- Đánh giá tình trạng mảnh ghép - Đánh giá tình trạng tái tạo biểu mô giác mạc	Không	- Giảm đau - Giảm viêm - Ngừa bội nhiễm	Như trên	Như trên
- Xuất viện - Hướng dẫn bệnh nhân giữ vệ sinh mắt <b><i>Nếu BN nhức mắt, nhìn mờ thì tái khám lại ngay</i></b>					

## **2. Quản lý, dinh dưỡng và tư vấn cho người bệnh**

- Tái khám sau mổ theo ngày hẹn ghi trên giấy xuất viện.
- Cắt chỉ sau 10 ngày
- Trước ngày hẹn tái khám, nếu mắt mổ đau nhức, nhìn mờ hay kích thích chảy nước mắt thì đến khám ngay.

### Chăm sóc và giữ vệ sinh mắt:

- Tránh những công việc và môi trường tiếp xúc với khói, bụi, những nơi không hợp vệ sinh.
- Khi vệ sinh cá nhân, tránh để nước và xà phòng rơi vào mắt.
- Mỗi sáng, dùng Col. Effticol rửa mắt và lau sạch mắt bằng gạc vô trùng trước khi nhỏ thuốc theo hướng dẫn.

### Chế độ dinh dưỡng:

- Ăn uống bình thường, không kiêng cử.
- Đối với bệnh nhân mắc các bệnh lý khác hiện đang sử dụng thuốc theo toa bác sĩ (như tăng huyết áp, đái tháo đường, v.v...) thì tiếp tục điều trị như bình thường.