

**PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ  
DẠ SINH NON**

**1. Chẩn đoán và điều trị**

Ngày	Khám	Cận lâm sàng	Nguyên tắc điều trị	Thuốc	Chăm sóc
1	- Dấu sinh tồn. - Con gò: 4 con/20 phút hoặc 8 con/60 phút. Con gò gây đau - CTC mở > 2cm, xóa >80% - Ra nhầy hồng hoặc dịch nhầy CTC	- CTG theo dõi tim thai, con gò - Siêu âm thai, đo chiều dài kênh CTC < 25mm	- Dùng thuốc cắt cơn co trong vòng 48h - Hỗ trợ phổi bằng corticoid - Nằm nghỉ ngơi, không kích thích đầu vú - Tránh giao hợp - Dinh dưỡng đầy đủ	- Atosiban - Nifedipine - Salbutamol - Utrogestan - Betene - Dexamethasone	- HL cấp 3, tăng cường dinh dưỡng, sữa tươi.

**2. Quản lý, dinh dưỡng và tư vấn cho người bệnh Trong khi nằm viện**

Theo dõi sát tim thai, con gò

Tư vấn nguy cơ sinh non, bé non tháng.

Tăng cường dinh dưỡng, sữa tươi

**Sau khi xuất viện**

Tư vấn theo dõi thai máy, con co, huyết âm đạo