

**PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ  
TÁNG SINH TUYẾN TIỀN LIỆT**

**1. Chẩn đoán và điều trị:**

	<b>Khám</b>	<b>Cận lâm sàng</b>	<b>Nguyên tắc điều trị</b>	<b>Thuốc</b>	<b>Chăm sóc</b>
<b>Ngày Vào viện</b>	- Khám tổng quát - Khám hệ tiết niệu - Khám trực tràng	- Xét nghiệm tiền phẫu - Xét nghiệm nước tiểu - Xét nghiệm PSA - Sinh thiết tuyến tiền liệt -	- Ổn định nội khoa trước mổ	- Kháng sinh( nếu có nhiễm khuẩn kèm theo) - Kháng viêm - Giảm đau	- Theo dõi sinh hiệu - Chế độ dinh dưỡng - Vệ sinh cá nhân sạch sẽ để chuẩn bị cho cuộc mổ.
<b>Ngày mổ</b>	- Khám tổng quát		- Đánh giá lại bệnh nhân trước mổ, chuẩn bị tâm lý cho bệnh nhân. - Gây tê tủy sống - Phẫu thuật(nội soi, mổ mở, mổ bàng quang ra da)	- Thuốc phòng mổ	- Thụt tháo - Hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn - Đặt sonde tiểu, tưới rửa liên tục 6 giờ. - Theo dõi thân nhiệt..
<b>Ngày sau mổ</b>	- Khám tổng quát		- Giảm đau - Kháng sinh dự phòng - - Khángviêm - Nhuận tràng	- Giảm đau - Kháng sinh dự phòng - - Khángviêm - Nhuận tràng	- Theo dõi nước tiểu - Rút ống thông tiểu sau 3 đến 5 ngày
<b>Ngày Ra viện</b>	- Khám tổng quát		- Giảm đau - Kháng sinh - Nhuận tràng	- Giảm đau - Kháng sinh - Nhuận tràng	- Tổng kết viện phí - Hướng dẫn thủ tục xuất viện. - Giáo dục sức khỏe

## **2. Quản lý, dinh dưỡng và tư vấn cho người bệnh:**

### **Trong khi nằm viện**

- Chuẩn bị đầy đủ các xét nghiệm để chuẩn bị cuộc mổ.
- Ký giấy cam đoan phẫu thuật.
- Nhịn ăn uống trước mổ 6 -8 giờ.
- Chuyển phòng mổ
- Sau mổ 6 giờ được uống nước, sữa.
- Ngày đầu sau mổ ăn cháo, cơm và vận động đi lại.
- Nằm viện từ 3 đến 5 ngày

### **Sau khi xuất viện**

- \_ Uống thuốc theo toa
- \_ Uống nhiều nước hàng ngày, tránh táo bón.
- \_ Tái khám theo hẹn